

## Onkruidbestrijding in cichorei start al voor zaai

In cichorei en witlof zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding na opkomt nog steeds zeer beperkt. Werk daarom tijdens de zaaibedbereiding **8 l Bonalan** in. Spuit de Bonalan altijd over de ploegsmeden en werk deze daarna binnen 2 uur goed door de toplaag. Daarnaast blijft het advies om direct na zaai een bespuiting uit te voeren met **2,5 l Kerb Flo**.

## Onkruidbestrijding in zaaiuien

Ons advies is om afhankelijk van de zwaarte van de grond, bij voorkeur direct na zaai **0,75 – 1 l Stomp 400 SC** op een nog (zaai)vochtige grond te spuiten. Bij deze lage doseringen Stomp 400 SC hoeft niet gewacht te worden tot het zaad gekiemd ligt. Zorg wel dat het uienzaad minimaal 2 cm diep gezaaid en goed bedekt is. Spuit nooit vlak voor heel veel neerslag!

## Wel of geen bodemherbicide in bieten

Een bodemherbicide aan de basis geeft meer mogelijkheden om een na-opkomst onkruidbestrijding wat uit te stellen omdat er dan een beetje een “rem” op de onkruidgroei staat. Daarnaast is het voor de bestrijding van onkruiden zoals kamille, hondspeterselie, varkensgras en bingelkruid aan te raden een bodemherbicide aan de basis in te zetten.

Op percelen waar o.a. kamille wordt verwacht:

- **2 – 3 kg Pyramin DF** (Pyramin DF is niet meer leverbaar, voorraad kan opgebruikt worden tot 30 juni 2020)
- **2 – 3 l Goltix/ Bettix** (heeft de voorkeur op bonte of lichte grond met minder dan 2% humus.)

Op percelen waar o.a. hondspeterselie wordt verwacht:

- **50 – 100 ml Centium 360 CS** (Op zandgrond of wanneer sprake is van een slechte structuur, de laagste dosering aanhouden i.v.m. kans op schade (witverkleuring); Wanneer ook kamille wordt verwacht **2 l Goltix/ Bettix** toevoegen. Centium 360 CS heeft ook een goede werking tegen bingelkruid, varkensgras en kleeftkruid.)
- **3 l Goltix Queen** (Is zachter voor het gewas dan Centium en bestrijdt tevens kamille)

## Wanneer een granulaat inzetten bij de teelt van (poot)aardappelen

Bij aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes en de op lichtere grond voorkomende vrijlevende wortelaaltjes, die het tabaksratelvirus over kunnen brengen, kunt u door de inzet van Vydate 10G of Nemathorin 10G vermeerdering van aaltjes beperken en kwaliteitsschade (o.a. kringerigheid) voorkomen.

Ter ondersteuning van de luisbestrijding in pootaardappelen kan Vydate 10G en Nemathorin 10G gebruikt worden. De granulaten hebben ongeveer 9 weken werking tegen luizen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Nemathorin 10G minder goed in wateroplosbaar is dan Vydate 10G en daardoor meer bodemvocht nodig heeft voor een goede werking.

De laatste jaren zien we een duidelijke toename van schade door ritnaalden. Ritnaalden zijn vooral te verwachten vanaf het tweede jaar na het scheuren van grasland of graszaad. Na beëindiging van de toelating van Mocap 15G is Nemathorin 10G het beste alternatief.

	Nemathorin 10G*	Vydate 10 G
Aaltjes	7,5 kg in de rij (30 kg volvelds)	10 kg in de rij (20 kg volvelds)
Luizen	7,5 kg in de rij (nevenwerking)	10 kg in de rij (20 kg volvelds)
Ritnaalden	7,5 kg in de rij (30 kg volvelds)	Nauwelijks werking

\*) Nemathorin 10G alleen toe te passen in aardappelen die een minimale groeiduur van 120 dagen hebben!

## Korte TIPs

- Gebruik voor de onkruidbestrijding in blauwmaanzaad direct na zaai, afhankelijk van de zwaarte van de grond, **0,1-0,15 l Centium 360 CS**.
- Net als afgelopen seizoen heeft Fox 480 SC ook dit seizoen een tijdelijke toelating gekregen in de teelt van Engels raaigras van 1 maart t/m 30 april 2020. De dosering **0,65 l Fox 480 SC** is o.a. sterk op ereprijs en paarse dovenetel.
- Werk op grond waar sclerotinia een probleem is tijdig **2 – 4 kg Contans WG** in tot een diepte van 3 – 5 cm. In akkerbouwgewassen is de maximum dosering 2 kg. Gebruik voor toepassing een goed gereinigde spuitmachine!