

Onkruidbestrijding in zomergranen

Wacht met de onkruidbestrijding tot de meeste onkruiden gekiemd zijn. Komen ook aardappelopslag en wortelonkruiden voor, dan kan de bestrijding beter wat uitgesteld worden tot deze onkruiden wat verder ontwikkeld zijn.

In zomertarwe (o.a. ook tegen windhalm, jonge duist, paarse dovenetel en ereprijs):

- **130 gram Capri Twin + 1 l MCPA + 0,3 - 0,45 l Starane Top + 1 l Robbester** (voor de gelijktijdige bestrijding van aardappelopslag de hoogste dosering Starane Top aanhouden)

In alle zomer- en wintergranen (uiterlijk tot in het vlagbladstadium!):

- **1 l Tapir + 1,5 - 2 l MCPA** (geeft tevens een goede bestrijding van distels, hoefblad en cichoreioplslag).

Bij aanwezigheid van ereprijs of grotere dovenetels kan **70 gram Biathlon 4D** of **1,5 l Fox 480EC** toegevoegd worden. Meng nooit Fox 480EC met olie of uitvloeier, dit veroorzaakt verbranding! Tegen aardappelopslag **0,3 - 0,45 l Starane Top** toevoegen.

Het effect op aardappelopslag is het grootst wanneer tijdens bewolkt weer en een hoge luchtvochtigheid gespoten wordt op opslagplanten die 10 - 20 cm groot zijn.

Groei regulatie van zomergranen

In zomertarwe wordt met een éénmalige inzet van **1 - 1,25 l CeCeCe** aan het einde van de uitstoeling meestal voldoende halmversteving verkregen om legering te voorkomen. Wanneer een extra zwaar gewas wordt verwacht kan ook gekozen worden voor de inzet van **0,3 - 0,5 kg Prodx** op het moment van einde uitstoeling - begin schieten.

In zomergerst is het advies om voor het verschijnen van de tweede knoop **0,4 l Moddus EVO** te spuiten. Wanneer een extra zwaar gewas wordt verwacht kan gekozen worden voor een gesplitste toepassing van 2 keer **0,3 l Moddus EVO**. Tenslotte kan, tot het verschijnen van de kafnaalden, de lengtegroei nog geremd worden met **0,6 - 0,8 l Yatze** om aarknikken te voorkomen.

Onkruidbestrijding in zaaiuien

De beste onkruidbestrijding in uien wordt verkregen door het regelmatig aanvullen van de bodemherbiciden op vochtige grond. Vanaf het moment dat de uien een eerste echt pijpje hebben van 3 cm kan hiervoor gebruik worden gemaakt van **1-1,5 l Wing P**.

Vanaf het moment dat het eerste pijpje 3 cm lang is kan aanwezig onkruid met contactmiddelen bestreden worden. Gebruik een grove dop en spuit met minimaal 400 l water tijdens windstil weer op een afgehard gewas (droge grond). Wacht wel 4-5 dagen met de contactbespuiting nadat er Dual Gold of Boxer is gespoten.

- **0,25 - 0,5 kg Lentagran + 0,15 - 0,4 l Emblem Flo*** of **Bromotril* + 0,075-0,12 l Starane Top** (sterk op o.a. klein kruiskruid, melden, duivekervel en wolfsmelk).
- **0,25 - 0,4 l Basagran + 0,15 - 0,4 l Emblem Flo*** of **Bromotril* + 0,075-0,12 l Starane Top** (sterk op o.a. veelknopigen en hondspeterselie).

Indien nodig de bespuiting na 5 - 7 dagen herhalen.

*)Emblem Flo en Bromotril zijn door ons niet meer leverbaar, de opgebruiktermijn loopt tot 17-9-2021.

Onkruidbestrijding in peulvruchten na opkomst

Onkruid in kiembladstadium kan in peulvruchten (o.a. conservenerwten, kapucijners, tuinbonen en stamslabonen) na opkomst, in elk stadium van het gewas, bestreden worden met **0,3 - 0,5 l Basagran + 0,25 l Webo Wett** of **0,3 l Promotor**. Bij het verschijnen van nieuw onkruid de bespuiting herhalen (interval min. 7 dagen).

Vanaf het 1^e drietallige blad in stamslabonen en 2 - 3 samengestelde bladeren bij erwten kan de dosering verhoogd worden naar **1 - 1,5 l Basagran + 0,25 l Webo Wett** of **0,3 l Promotor** of vervangen worden door **1,25 l Corum + 0,3 l Promotor**.

Corum is een versterkte Basagran, het heeft een plus op de bestrijding van o.a. papagaaikruid, varkensgras, zwaluwtong, hondspeterselie, duivenkervel, melden, zwarte nachtschade en (jong) straatgras. Pas Corum bij voorkeur toe op een vochtige grond. Basagran en Corum bij dagtemperaturen >20°C pas tegen de avond spuiten.

Korte TIPs

- De weersomstandigheden lijken eindelijk geschikt te worden voor de bestrijding van goed ontwikkelde ridderzuring in grasland. Bij milde temperaturen (13-25°C) en niet te koude nachten (>5°C) kan de bestrijding het best uitgevoerd worden met **1,5 l Tapir + 0,3 l Starane Top/ 1,5 l Jepolinex Pro**.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.